

Aufklärungsblatt zu Nebenwirkungen von Impfungen

Damit der Arzt entscheiden kann, ob er Sie oder Ihr Kind heute wirksam und ohne besondere Gefährdung impfen kann, werden Sie gebeten, die folgenden Angaben zum Gesundheitszustand zu machen:

Zeichen akuter Erkrankungen (z.B. fieberhafte Infektionen), schwere Unfälle oder Operationen innerhalb der letzten drei Monate: nein ja, folgende:

Schwere chronische Erkrankungen, z.B. Leukämie, Krebs, AIDS, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), chronische Hepatitis, chronische Nierenleiden, allergisches Asthma, Gelenkrheumatismus, Tuberkulose, Epilepsie o.a. Nervenleiden: nein ja, folgende:

Einnahme von Medikamenten oder Behandlungen, die stark auf das Immunsystem wirken, innerhalb der letzten drei Monate: nein ja, folgende: Kortison Immunsuppressiva andere, nämlich:

Allergien gegen: Hühnereiweiß andere Substanzen / Medikamente / Impfungen, nämlich:

Lebend-Impfungen (z.B. gegen Gelbfieber, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen) in den letzten 4 Wochen:
nein ja, folgende:

Besteht eine Schwangerschaft? nein ja Wird gestillt? nein ja

Alle von uns empfohlenen Impfungen sind sehr gut verträglich und bieten eine hohe Wirksamkeit. Aus rechtlichen Gründen müssen wir Sie dennoch über alle jemals aufgetretenen Nebenwirkungen aufklären: Jede Injektionsimpfung kann *Schmerzen, Rötungen, Schwellungen und Verhärtungen an der Injektionsstelle* sowie in seltenen Fällen *allergische Reaktionen* wie Hautausschlag und Juckreiz, Herz-Kreislauf- und Atmungsstörungen hervorrufen. *In der Schwangerschaft und Stillzeit* sollte nur unter strenger Nutzen-Risikoabwägung geimpft werden, da für diese Bereiche zum Teil nur unzureichende Erfahrung mit den jeweiligen Impfstoffen besteht. Besonderheiten bei Impfungen *im Säuglings- und Kindesalter* müssen zusätzlich berücksichtigt werden (s.u). Nach Herstellerangaben können zudem folgende Nebenwirkungen auftreten (Auswahl der am häufigsten verwendeten reisemedizinischen Impfstoffe):

Impfstoff (Krankheit)	Mögliche Nebenwirkungen	Seltene Nebenwirkungen	Gegenanzeigen
Stamaril® (Gelbfieber)	Hauptsächlich zwischen dem 4. und dem 7. Tag nach der Impfung Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schwäche, leichtes Fieber	Schwellung der benachbarten Lymphknoten, Hirnentzündung, in Einzelfällen sind Todesfälle aufgetreten	Hühnereiweiß-Allergie , Kinder unter 9 Monaten, Schwangere vor allem im 1. Trimenon und chronisch Kranke, insbesondere mit Immundefekt (z.B. CD4-Zellen <400/µl) dürfen nicht geimpft werden; Alkohol sollte vermieden werden
Dukoral® (Cholera-Impfstoff)	Beschwerden des Magen-Darmtraktes		Kinder unter 2 Jahren dürfen nicht geimpft werden; Nahrungs- und Trinkkarenz 1 Stunde vor und nach der Impfung
Rabipur® Tollwut-Impfstoff-HDC® (Tollwut)	Fieber, Lymphknotenschwellung, Gelenkentzündung, Beschwerden des Magen- Darmtraktes	Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Kreislaufstörungen, Schweißausbruch, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, entzündliche Erkrankung des Nervensystems (Guillain-Barré-Syndrom)	Hühnereiweiß-Allergie (nur bei Rabipur), Schub einer bekannten Multiplen Sklerose möglich
Ixiaro® (Japanische Enzephalitis)	Schwindel, Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, grippale Symptome, Fieber, Kreislaufstörungen, Hautausschlag, Hautjucken, Gelenkentzündung	Generalisierte Nesselsucht (Urtikaria), Schleimhautschwellung (Quincke-Ödem), Verengung der Luftwege, bis 17 Tage nach der Impfung entzündliche Erkrankung des Nervensystems (Guillain-Barré-Syndrom), Hirnentzündung, Lähmungen	Akut und chronisch Kranke dürfen nicht geimpft werden; Alkohol sollte vermieden werden; Impfstoff in Deutschland nicht zugelassen; nicht im 1. Lebensjahr impfen
Nimenrix® (Meningokokken-Infektionen)	Fieber, grippale Symptome, Schüttelfrost	Muskeltonusverminderung, neurologische Störungen, Nephritis	Akut Kranke und Kinder nicht unter dem 2. Lebensjahr impfen
Typhim Vi® Typherix® Typhoral L® (Typhus abdominalis)	Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall		Akut Kranke und Kinder nicht unter 2. Lebensjahr impfen
Vaqta® Havrix 1440® HAVpur® (Hepatitis A aktiv)	Unterhautblutung, Abgeschlagenheit, Fieber, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Entzündung von Rachen und Atemwegen, Husten, Muskelschmerzen, Muskelsteifigkeit	Nesselsucht (Urtikaria), Schleimhautschwellung (Quincke-Ödem), Verengung der Luftwege, Verminderung der Blutplättchen, neurologische Erkrankungen	Akut Kranke und unter Einjährige nicht impfen; bei >55-jährigen vor Impfung Antikörper-Bestimmung sinnvoll

HBvaxPRO® Engerix B® (Hepatitis B)	Schwellung der benachbarten Lymphknoten, Abgeschlagenheit, Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel niedriger Blutdruck, Ohnmacht, Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Entzündung von Rachen und Atemwegen, Husten, Muskel- und Gelenkschmerzen, vorübergehende Verminderung der Blutplättchen	Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht, Schleimhautschwellung (Quincke-Ödem), Verengung der Luftwege, Schock, entzündliche Erkrankung des Nervensystems (Guillain-Barré-Syndrom, Polyradikuloneuritis, Sehnervenentzündung), Rückenmark- und Hirnentzündung	Akut Kranke sollten nicht geimpft werden
Twinrix® (Hepatitis A und Hepatitis B)	Abgeschlagenheit, Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel, Synkopen, Hypotonie, Übelkeit, Erbrechen, Lymphadenopathie	Bauchschmerzen, Durchfall, Muskel- und Gelenkschmerzen, Hautausschlag, Hautjucken, Nesselsucht, Leberfunktionsstörungen, Blutergüsse, entzündliche Erkrankung des Nervensystems	Akut Kranke und Kinder unter dem 1. Lebensjahr nicht impfen
IPV-Virelon® IPV-Mérieux® (Poliomyelitis)		Fieber, Kopfschmerzen allergische Reaktionen, entzündliche Veränderungen des Nervensystems	Akut Kranke und Kinder vor dem 3. Lebensmonat nicht impfen; Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit möglich (Vorsicht im 1. Trimenon)
Diphtherie Ads.® (Diphtherie)	Schwellung der benachbarten Lymphknoten, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen, Kreislaufreaktionen, Schweißausbruch, Schüttelfrost, Beschwerden des Magen-Darmtraktes	Bildung eines länger bestehenden Knötchens an der Impfstelle, entzündliche Erkrankung des Nervensystems (Guillain-Barré-Syndrom), vorübergehende Verminderung der Blutplättchen, allergische Erkrankung der Niere	Akut Kranke, Kinder vor dem 3. Lebensmonat und Rekonvaleszenten nicht impfen; Impfung in Schwangerschaft und Stillzeit möglich (Vorsicht im 1. Trimenon)
Covaxis® (Diphtherie, Pertussis und Tetanus)	Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen, Beschwerden des Magen-Darmtraktes, Hautausschlag	entzündliche Erkrankung des Nervensystems (Guillain-Barré-Syndrom), vorübergehende Verminderung der Blutplättchen, allergische Erkrankung der Niere, Enzephalopathie	Akut Kranke und Kinder vor dem 3. Lebensmonat nicht impfen; Impfung in Schwangerschaft bis auf das 1. Trimenon und Stillzeit möglich
Repevax® (Diphtherie, Pertussis, Tetanus und Poliomyelitis)	Schwellung der benachbarten Lymphknoten, Muskelschmerzen, Fieber, Atemnot, Kopfschmerzen, Schweißausbruch, Schüttelfrost, Beschwerden des Magen-Darmtraktes	Gelenkbeschwerden, entzündliche Erkrankung des Nervensystems (Guillain-Barré-Syndrom)	Kinder vor dem 6. Lebensjahr und akut Kranke nicht impfen
Pneumovax® Prevenar® (Pneumokokken-Infektionen)	Entzündungen der Lymphgefäße, Muskelschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen	Vorübergehende Verminderung der Blutplättchen und des roten Blutfarbstoffes bei bestehender Vorerkrankung	Kinder vor dem 2. Lebensjahr und akut Kranke nicht impfen
Fluad® Infectovac flu® Mutagriff® u.a. (Grippe)	Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, Muskel- und Gelenkbeschwerden	entzündliche Erkrankung des Nervensystems, vorübergehende Verminderung der Blutplättchen	Hühnereiweiß-Allergie , Kinder vor dem 6. Lebensmonat und akut Kranke nicht impfen

Hiermit erkläre ich, daß ich die obenstehenden Informationen verstanden und zur Kenntnis genommen habe. Es bestand in einem Gespräch ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. Folgende besondere Fragen wurden besprochen:

Name (in Druckbuchstaben):

Datum:

Unterschrift: